



Universidad Nacional Mayor de San Marcos

Universidad del Perú. Decana de América

Facultad de Medicina

Escuela Académico Profesional de Obstetricia

Características hematológicas y clínicas antes y después del parto en pacientes atendidas en el Instituto Nacional Materno Perinatal, 2011

TESIS

Para optar el Título Profesional de Licenciada en Obstetricia

AUTORES

Jessica Jackeline CABALLERO MARÍN

Flor Paola ZURITA BRUNO

ASESORES

Elba Guillermina BELAPATÍÑO PACHECO

Oscar Fausto MUNARES GARCÍA

Lima, Perú

2012

RESUMEN

OBJETIVO: Comparar las características hematológicas y clínicas antes y después del parto en pacientes atendidas en el Instituto Nacional Materno Perinatal.

MATERIAL Y MÉTODOS: Se realizó una investigación comparativa, con un diseño Prospectivo, transversal. Se analizaron las características hematológicas y clínicas antes y después del parto en 235 pacientes atendidas en el Instituto Nacional Materno Perinatal, El tipo de muestreo fue probabilístico sistemático con arranque cada 3 pacientes. La información se obtuvo de la revisión de historias clínicas, de entrevista con un formulario estructurado y de un examen clínico antes y después del parto. Se procedió a analizar los datos con estadísticas descriptivas medidas de tendencia central, medidas de posición en las variables cuantitativas, distribución de frecuencias en las variables cualitativas, se aplicaron la estadística inferencial t-student en las variables cuantitativas, prueba Chi cuadrado en las variables cualitativas ambas con un nivel significación estadística $p < 0,05$.

RESULTADOS: Con un nivel de confianza del 95% existe más casos de pacientes con nivel de concentración de hemoglobina ≥ 11 g/dL antes del parto (59.57%) que después del parto (22.98%). Se con nivel concentración de hemoglobina 10-10.9 g/dL antes del parto (36.17%) menor que después del parto (38.72%). se encontró menos casos con nivel de concentración de hemoglobina 7-9.9 g/dL antes del parto (4.26%) que después del parto (28.51%) y no se encontró ningún caso con nivel de concentración de hemoglobina < 7 g/dL antes del parto en comparación con después el parto (9.79%), el promedio de valor de hematocrito antes del parto ($33.2 \% \pm 2.9$) es mayor que el promedio de concentración de hematocrito después del parto ($29.2 \% \pm 3.9$). Existe menor presencia de palidez de piel y mucosas antes del parto (40.2 %) que después del parto (26.9 %). Se tiene palidez leve antes del parto (56.8 %) mayor que después del parto (48.7 %). Además se encontró que el promedio de concentración de hemoglobina antes de parto ($11.2 \text{ g/dL} \pm 1.2$) es mayor que el promedio de concentración de hemoglobina después del parto ($9.5 \text{ g/dL} \pm 1.7$).

CONCLUSIÓN: Se concluye que los valores de las características hematológicas y presencia de características clínicas son mayores antes que después del parto eutócico en pacientes atendidas en el Instituto Nacional Materno Perinatal.

PALABRAS CLAVES: Características hematológicas, características clínicas, Parto eutócico, gestantes, puérperas.